

投与計画書

| レジメン名 | | RAM+weekly PTX 療法 (1コース28日) | | | 適応:再発・進行胃癌 二次治療 | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------------|-------------------|-------|
| RP | 商品名 | 一般名 | 標準投与量 | | 標準投与量計算値 | 変更投与量 | 標準比 |
| ② | サイラムザ | ラムシルマブ (Ram) | 8 mg/kg | | mg | mg | 100 % |
| ④ | タキソール | パクリタキセル (PTX) | 80 mg/m ² | | mg | mg | 100 % |
| ★過敏症・インフュージョンリアクション対策 | | アルコール過敏症 | なし | | 減量等理由記載欄 | | |
| ① | デカドロン注3.3mg | デキサメタゾンナトリウム | 1 | A | | | |
| | ファモチジン注20mg | ファモチジン | 1 | V | | | |
| | ボラミン注5mg/1mL | 塩酸ジフェンヒドラミン | 1 | A | | | |
| ★嘔吐対策 | | | 催吐リスク : Low(10~30%) | | 急性嘔吐予防 | ※アレルギー対策でもデカドロン使用 | |
| ① | 5HT3RA不要 | インジセトン・グラネセトン・パロ/セトン | | | Day 2~3 | なし | |
| | イメドカプセル125mg | アブレピタント | 0 | C | | | |
| ★投与スケジュール 1コース 28日 | | | ★点滴時間 Day 1,15:3時間 Day 8 :2時間 | | | | |
| Day | 1.....8.....15.....22.....28 29 | | | | | | |
| PTX | ↓ ↓ ↓ 休 ↓ | | | | | | |
| Ram | ↓ 休 ↓ 休 ↓ | | | | | | |
| | | | | | | | |