

投与計画書

レジメン名				S-1+CDDP+HER 療法 (1コース21日)			適応:HER2陽性 胃がん	
HER2	IHC法:		FISH法					
RP	商品名	一般名		標準投与量	計算投与量	変更投与量	標準比	
②	ハーセプチン 初回/延期	トラスツズマブ (HER)		8 mg/kg	mg	mg	%	
	ハーセプチン 2回目以降	トラスツズマブ (HER)		6 mg/kg	mg	mg	%	
③	ランダ	シスプラチン (CDDP)		60 mg/m ²	mg	mg	%	
⑤	TS-1 20mg 25mg	S-1	剤型 OD	80 mg/m ²	mg/日	mg	%	
★前投薬 Infusion reaction対策/嘔吐対策 (high risk)								
①	デカドロン 3.3mg/1mL	デキサメタゾンナトリウム		3	A	ガイドライン(推奨) : 急性嘔吐		
	アロキシ注 0.75mg	インジセロン・グラニセロン・パロセロン		1	A	前投薬 :	5HT3RA +ステロイド+イモット125	
	イメドカプセル125mg	アプレピタント		1	C	遅発性嘔吐		
	ボラミン注5mg	クロルフェニラミン		1	A	Day 2~3:	デカドロン錠+イモット80	
★腎障害予防 hydration			心疾患、胸水腹水貯留、浮腫ある場合、負荷注意			Dr記載欄 (減量理由、治療方針等)		
①②	尿量目安:CDDP当日尿量3000mL以上 前日2000mL以上 2~3日1500mL以上確保→飲水指示、補液投与をして下さい。 他の補液を使用する場合は処方で反映させてください。 必要に応じ、Kの補充、利尿剤追加してください。							
⑦~⑨								
★投与スケジュール 1コース 21日				★点滴時間 Day 1,延期 :13時間30分 2回目以降 :12時間30分				
Day	1	8	15 休業	21	1(22) 2コース			
HER	↓(8mg/kg)		↓(6mg/kg)					
GDDP	↓		↓					
S-1	⇨		d1~d13(内服14日間)		④TS-1 Day1-21 朝、夕食後			
				ルート1	③前投薬30分 ④ハーセプチン30分 ⑤ランダ120分 ⑥マンニトール 120分			
				ルート2	輸液 ①② 輸液 ⑦⑧⑨			

黄色枠は、個々に応じて変更いたします。