

投与計画書

レジメン名				S-1+CDDP 療法 (1コース35日)		適応: 進行・再発胃がん	
RP	商品名	一般名	標準投与量	計算投与量	変更投与量	標準比	
③	ランダ	シスプラチン(CDDP)	60 mg/m ²	mg	mg	100 %	
⑤	TS-1 20mg 25mg	S-1 剤型 OD	80 mg/m ²	mg/日	mg	100 %	
★前投薬 Infusion reaction対策/嘔吐対策(high risk)							
①	デカロン 3.3mg/1mL	デキサメタゾンナトリウム	3	A	ガイドライン(推奨) : 急性嘔吐		
	アロキシ注 0.75mg	インジセロン・グラニセロン・パロセトン	1	A	前投薬 :	5HT3RA +ステロイド+イメド ¹ 25	
	イメドカプセル125mg	アプレピタント	1	C	遅発性嘔吐		
★腎障害予防 hydration		心疾患、胸水腹水貯留、浮腫ある場合、負荷注意			Dr記載欄 (減量理由、治療方針等)		
①②		尿量目安: CDDP当日尿量3000mL以上 前日2000mL以上 2~3日1500mL以上確保→飲水指示、補液投与をして下さい。 他の補液を使用する場合は処方で反映させてください。 必要に応じ、Kの補充、利尿剤追加してください。					
⑦~⑨							
★投与スケジュール 1コース 35日				★点滴時間 :10時間以上			
Day	1	8	15	22	29	35	
CDDP	↓						
S-1	21日服用 14日間休薬						

黄色枠は、個々に応じて変更いたします。