

投与計画書

レジメン名		AFB+FOLFIRI療法 (1コース:14日)			適応:進行・再発 結腸・直腸癌		
RP	商品名	一般名	投与量	標準投与量	変更投与量	標準比	
②	ザルトラップ	アフリベルセプト ベータ (AFB)	4 mg/kg	mg	mg	%	
④	カンプト	イリノテカン (CPT-11)	150 mg/km <sup>2</sup>	mg	mg	%	
⑤	レボホリナート	レボホリナートカルシウム (LV)	200 mg/km <sup>2</sup>	mg	mg	%	
⑥	(急速)5-FU	フルオロウラシル	400 mg/km <sup>2</sup>	mg	mg	%	
⑦	(持続)5-FU	フルオロウラシル	2400 mg/km <sup>2</sup>	mg	mg	%	
★過敏症・インフュージョンリアクション対策				減量等理由記載欄			
①	デカドロン注3.3mg	デキサメタゾンナトリウム	2 A				
★嘔吐対策				ガイドライン(推奨) : 急性嘔吐			
①	アロキシ注 0.75mg	グラニセトン・パロ/セトン	1 A	前投薬 : 5HT3RA +ステロイド			
	イメドカプセル125mg	アプレピタント	0 C	遅発性嘔吐(アロキシ使用時は省略可能)			
★投与スケジュール 1コース 14日				Day 2~3:		デカドロン2~3mg	
Day	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16	★点滴時間 3時間45分+46時間				
AFB	↓ ↓						
CPT11	↓ ↓						
LV	↓ ↓						
5-FU	↓ ↓						