

投与計画書

レジメン名		Bev+CPT-11+S-1(Bev+IRIS)療法 (1コース21日)		適応:切除不能・再発大腸癌		
RP	商品名	一般名	標準投与量	標準投与量計算値	変更投与量	標準比
②	アバスチン	ベバシズマブ(Bev)	7.5 mg/kg	mg	mg	%
③	カンプト	イリノテカン(CPT-11)	150 mg/m ²	mg	mg	%
⑤	TS-1 20mg 25mg	S-1 剤型 OD錠	80 mg/m ²	mg/日	mg	%
嘔吐対策 リスク(ASCO): moderate(30~90%)			投与量	ガイドライン(推奨): 急性嘔吐		
① 前投薬	デカドロン 3.3mg/1mL	デキサメタゾンナトリウム	1 A	前投薬:	5HT3RA +ステロイド 推奨	
	アロキシ注 0.75mg	グラニセトン・パロセトロン	1 A	遅発性嘔吐		
	イメンドカプセル125mg	アプレピタント	1 C	Day 2~3:	デカドロン錠+イメンド80	
★投与スケジュール 1コース 21日			★点滴時間 : 初回:3時間30分 2回目:3時間 3回目以降:2時間45分			
Day	1..... 8..... 15..... 22.....					
BEV	↓	休 休 ↓				
CPT11	↓	休 休 ↓				
S-1	1~14日 2コース					

①前投薬30分	②アバスチン 30~90分	③カンプト 90分	④生食100 15分
⑤TS-1 day1-14 朝、夕食後 day15-21 休薬			