

投与計画書

| レジメン名 | | BEV+SOX 療法 (1コース21日) | | 適応:切除不能・再発大腸癌 | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|---|------------------|------------------|-----|
| RP | 商品名 | 一般名 | 標準投与量 | 標準投与量計算値 | 変更投与量 | 標準比 |
| ② | アバステン | ペバシズマブ(Bev) | 7.5 mg/kg | mg | mg | % |
| ④ | エルブラット注100mg | オキサリプラチン(L-OHP) | 130 mg/m ² | mg | mg | % |
| ⑤ | TS-1 20mg 25mg | S-1 剤型 OD錠 | 80 mg/m ² | mg/日 | mg | % |
| 嘔吐対策 リスク(ASCO): moderate (30~90%) | | | 投与量 | ガイドライン(推奨): 急性嘔吐 | | |
| ① 前投薬 | デカドロン 3.3mg/1mL | デキサメタゾンナトリウム | 2 A | 前投薬: | 5HT3RA +ステロイド 推奨 | |
| | アロキシ注 0.75mg | グラニセロン・パロセトン | 1 A | 遅発性嘔吐 | | |
| | イメンドカプセル125mg | アプレピタント | 0 C | Day 2~3: | デカドロン錠4~8mg | |
| 投与経路: | | 末梢静脈 | | | | |
| ★投与スケジュール 1コース 21日 | | | ★点滴時間 : 初回:4時間15分 2回目:3時間45分 3回目以降:3時間15分 | | | |
| Day | 1..... 8..... 15..... 22..... | | | | | |
| BEV | ↓ | 休 休 ↓ | | | | |
| L-OHP | ↓ | 休 休 ↓ | | | | |
| S-1 | 1~14日 2コース | | | | | |