投与計画書

ﾚｼﾞﾒﾝ	BEV+ロンサーフ(TAS-102)療法　1ｺｰｽ;28日間			適応:進行･再発大腸癌		
商品名		一般名	投与量	標準投与量	変更投与量	標準比
内服	ロンサーフ配合錠T	ﾄﾘﾌﾙﾘｼﾞﾝ･ﾁﾋﾟﾗｼﾙ配合	70 mg/㎡	mg/day	mg/da	段階減量
②	アバスチン	ベバシズマブ(BEV)	5 mg/Kg	mg	mg	%
☆嘔吐対策		リスク(ASCO): moderate(30～90%)	投与量	ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(推奨) ： 急性嘔吐		
①前投薬	デカドロン 3.3mg/1mL	デキサメタゾンナトリウム	1 A	前投薬 ：	5HT3RA ＋ｽﾃﾛｲﾄﾞ 推奨	
	アロキシ注 0.75mg	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ･ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ	1 A	遅発性嘔吐		
	イメンドカプセル125mg	アプレピタント	0 C	Day 2～3:	なし	

☆投与スケジュール

ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴　↓(day1)　↓(day15)

DAY	1	6	8	13	15	22
ロンサーフ	内服5日間	休	内服5日間	休	休	休
	1週目		2週目		3週目	4週目

☆ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴

1時間15分　初回2時間15分　2回目1時間45分