

投与計画書

レジメン名		Bev+XELIRI (Cape +CPT11) 療法 1コース:21日		適応:進行・再発 結腸・直腸癌		
RP	商品名	一般名	投与量	標準投与量	変更投与量	標準比
②	アバステン注	ペバシズマブ(Bev)	7.5 mg/kg	mg	mg	%
③	カンプト注	イリノテカン(CPT11)	200 mg/m ²	mg	mg	%
⑤	ゼローダ錠300mg	カベシタピン(Cape) 300mg	1600 mg/m ² /day	mg/day	mg/day	%
★嘔吐対策 moderate (30~90%)			投与量	ガイドライン(推奨): 急性嘔吐		
① 前投薬	デカドロン 3.3mg/1mL	デキサメタゾンナトリウム	2 A	前投薬:	5HT3RA +ステロイド*	
	アロキシ注 0.75mg	インゾセトン・グラニセトン・パロセトン	1 V	遅発性嘔吐		
	イメドカプセル125mg	アプレピタント	0 C	Day 2~3:	デカドロン錠	
★投与スケジュール 1コース 21日			★点滴時間 :2時間45分			
Day	1.....8.....15.....21 22.....		メイン			
Bev, CPT11	↓ ↓		サブ			
Cape	14日間 → 7日間休薬					
	1コース		2コース			