

レジメン名		Bev+XELOX (Cape +L-OHP) 療法 1コース:21日		適応:進行・再発 結腸・直腸癌		
RP	商品名	一般名	投与量	標準投与量	変更投与量	標準比
②	アバスチン注	ベバシズマブ(Bev)	7.5 mg/kg	mg	mg	%
③	エルプラット注	オキサリプラチン(I-OHP)	130 mg/m ²	mg	mg	%
⑤	ゼローダ錠300mg	カペシタビン(Cape) 300mg	2000 mg/m ² /day	mg/day	mg/day	%
★嘔吐対策		moderate (30~90%)	投与量	ガイドライン(推奨) : 急性嘔吐		
① 前投薬	デカドロン 3.3mg/1mL	デキサメタゾンナトリウム	2 A	前投薬 :	5HT3RA +ステロイド*	
	アロキシ注 0.75mg	インジセトン・グラニセトン・パロセトン	1 V	遅発性嘔吐		
	イメドカプセル125mg	アプレピタント	0 C	Day 2~3:	デカドロン錠4~8mg	
★投与経路			★Dr記載欄 (減量理由、治療方針等)			
末梢静脈		末梢ルート:エルプラットによる血管痛あり デカドロン3.3mg混注				
末梢ルート:エルプラットによる血管痛あり デカドロン3.3mg混注						
★投与スケジュール 1コース 21日			★点滴時間 :3時間15分			
Day	1.....8.....15.....21 22.....					
Bev, OHP	↓ ↓					
Cape	14日間 → 7日間休業					
	1コース 2コース					