

投与計画書

レジメン名		mFOLFOX6療法 (1コース:14日)		適応:術後補助化学療法/進行・再発 結腸・直腸癌		
RP	商品名	一般名	投与量	標準投与量	変更投与量	標準比
②	エルプラット	オキサリプラチン (I-OHP)	85 mg/m ²	mg	mg	%
③	レボホリナート	レボホリナートカルシウム (LV)	200 mg/m ²	mg	mg	%
④	(急速)5-FU	フルオロウラシル	400 mg/m ²	mg	mg	%
⑤	(持続)5-FU	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	mg	mg	%
★嘔吐対策		moderate risk (30~90%)		ガイドライン(推奨) : 急性嘔吐		
① 前投薬	デカドロン 3.3mg/1mL	デキサメタゾンナトリウム	2	A	前投薬 :	5HT3RA +ステロイド
	アロキシ注 0.75mg	グラネセトン・パロ/セトン	1	A	遅発性嘔吐	
	ボラミン5mg/1mL	クロルフェニラミン	1	A	Day 2~3:	デカドロン錠4~8mg
	イメンドカプセル125mg	アプレピタント	0	C		
★投与スケジュール 1コース 14日			★点滴時間 2時間45分+46時間			
Day	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16					
L-OHP	↓ ↓					
LV	↓ ↓					
5-FU	↓ ↓					