

投与計画書

| レジメン名 | | Pmab+mFOLFOX6療法 (1コース:14日) | | | 適応:進行・再発の結腸・直腸癌(RAS野生型) | | |
|--------------------|--|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--|
| RP | 商品名 | 一般名 | 標準投与量 | 標準投与量計算値 | 変更投与量 | 標準比 | |
| ① | ベクティビックス | パニツムマブ(Pmab) | 6 mg/kg | mg | mg | % | |
| ③ | エルプラット | オキサリプラチン (I-OHP) | 85 mg/m ² | mg | mg | % | |
| ④ | レボホリナート | レボホリナートカルシウム (LV) | 200 mg/m ² | mg | mg | % | |
| ⑤ | (急速)5-FU | フルオロウラシル | 400 mg/m ² | mg | mg | % | |
| ⑥ | (持続)5-FU | フルオロウラシル | 2400 mg/m ² | mg | mg | % | |
| ★嘔吐対策 | | moderate (30~90%) | | 投与量 | | ガイドライン(推奨) : 急性嘔吐 | |
| ② 前投薬 | デカドロン 3.3mg/1mL | デキサメタゾンナトリウム | 1 | A | 前投薬 : | 5HT3RA +ステロイド* | |
| | アロキシ注 0.75mg | インジメトロン・グラニセロン・パロセトロン | 1 | A | 遅発性嘔吐 | | |
| | イメンドカプセル125mg | アプレピタント | 0 | C | Day 2~3: | デカドロン錠4~8mg | |
| ★投与スケジュール 1コース 14日 | | | | ★点滴時間 3時間45分+46時間 | | | |
| Day | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16.. | | | | | | |
| 点滴 | ↓ ← → ↓ ← → | | | | | | |
| | | | | | | | |