

レジメン名		RAM+FOLFIRI療法 (1コース:14日)			適応:進行・再発 結腸・直腸癌(2nd)				
RP	商品名	一般名	投与量	標準投与量	変更投与量	標準比			
②	サイラムザ	ラムシルマブ (Ram)	8 mg/kg	mg	mg	%			
④	カンプト	イリノテカン(CPT-11)	150 mg/km ²	mg	mg	%			
⑤	レボホリナート	レボホリナートカルシウム (LV)	200 mg/km ²	mg	mg	%			
⑥	(急速)5-FU	フルオロウラシル	400 mg/km ²	mg	mg	%			
⑦	(持続)5-FU	フルオロウラシル	2400 mg/km ²	mg	mg	%			
★過敏症・インフュージョンリアクション対策				減量等理由記載欄					
①	デカドロン注3.3mg	デキサメタゾンナトリウム	3 A						
	ポララミン注5mg/1mL	塩酸ジフェンヒドラミン	1 A						
★嘔吐対策 催吐性リスク : moderate (30~90%)				ガイドライン(推奨) : 急性嘔吐					
①	アロキシ注 0.75mg	グラネセロン・パロセトロン	1 A	前投薬 :	5HT3RA +ステロイド				
	イメドカプセル125mg	アプレピタント	0 C	遅発性嘔吐(アロキシ使用時は省略可能)					
★投与スケジュール 1コース 14日				Day 2~3:		デカドロン錠4~8mg			
Day	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	★点滴時間 4時間+46時間							
Ram	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓								
CPT11	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	①前投薬30分							
LV	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	⑤レボホリナート 120分							
5-FU	↓ ⇄ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	⑦持続 5FU 46時間							
		②サイラムザ 60分		③生食 15分		④カンプト 90分		⑥5FU 15分	