

投与計画書

レジメン名		FOLFIRINOX/mFOLFIRINOX療法 コース:14日			適応: 治癒切除不能な膵がん(1st Line)		
RP	商品名	一般名	標準投与量	標準投与量計算値	変更投与量	標準比	
②	エルプラット	オキサリプラチン(I-OHP)	85 mg/m <sup>2</sup>	mg	mg	%	
③	レボホリナート	レボホリナートカルシウム	200 mg/m <sup>2</sup>	mg	mg	%	
④	カンプト	イリノテカン(GPT-11)	150 mg/m <sup>2</sup>	mg	mg	%	
⑤	(急速)5-FU	フルオロウラシル	0 mg/m <sup>2</sup>	mg	mg	%	
⑥	(持続)5-FU	フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	mg	mg	%	
★嘔吐対策		リスク: High (>90%)	投与量	ガイドライン(推奨) : 急性嘔吐			
① 前投薬	デカドロン 3.3mg/1mL	デキサメタゾンナトリウム	2 A	前投薬 :	デカドロン6.6mg+5HT3RA+イモット <sup>®</sup> 125		
	アロキシ注 0.75mg	インジセトン・グラニセトン・パロセトン	1 A	遅発性嘔吐			
	イメンドカプセル125mg	アプレピタント	1 C	Day 2~3:	デカドロン錠+イモット <sup>®</sup> 80		
★投与スケジュール コース 14日			★点滴時間 4時間15分+46時間				
day	1.....15.....						
	↓ ↓						
	コース目	2コース目					