

投与計画書

レジメン名		カバジタキセル(GTX)療法 (1コース21日)			適応:ホルモン不応性前立腺癌		
RP	商品名	一般名	標準投与量	標準投与量計算値	変更投与量	標準比	
②	ジェブタナ注	カバジタキセル(GTX)	25 mg/m <sup>2</sup>	mg	mg	%	
内服	プレドニン錠	プレドニゾン	10 mg/day	10 mg	mg	%	
★アレルギー対策		アルコール過敏症	なし	※アレルギー反応は、CTX及び溶媒のポリリルベート80Iによる			
①	デカドロン 3.3mg/1mL	デキサメタゾンナトリウム	2 A	減量等理由等 Dr記載欄			
	ファモチジン注20mg	ファモチジン	1 V				
	ポララミン注5mg/1mL	塩酸ジフェンヒドラミン	1 A				
★嘔吐対策		Low risk(10~30%) 症状に応じて追加		急性嘔吐d1	デカドロン +必要に応じて		
①	カイトリル 1mg/1mL	グラニセトン・パロセトン	1 V	遅発性d2~3:	なし		
	イメドカプセル125mg	アプレピタント	0 C				
★FN予防 (GCSF 一次予防)		FN risk 20%以上					
day3	ジーラスタ皮下注3.6mg	ペグフィルグラスチム	1 Syn	抗がん投与後、24時間以上あけること			
★投与スケジュール		★点滴時間 :1時間45分					
Day	1.....8.....15.....22(2コース)						
CTX	↓ ↓						
PSL	連日内服						
1コース 21日							