

投与計画書

レジメン名		GC療法(GEM+CDDP) (1コース:21日)			適応:胆道がん		
RP	商品名	一般名	投与量	標準投与量	変更投与量	標準比	
⑤	ジェムザール	ゲムシタピン(GEM)	1000 mg/m <sup>2</sup>	mg	mg	100 %	
④	ランダ	シスプラチン(CDDP)	25 mg/m <sup>2</sup>	mg	mg	100 %	
★嘔吐対策(CDDP)			: moderate risk	投与量	ガイドライン(推奨) : 急性嘔吐		
③ 前投薬	デカドロン 3.8mg/1mL	デキサメタゾンナトリウム	2	A	前投薬 :	5HT3RA + ステロイド ± NK1RA	
	アロキシ注 0.75mg	インジセトン・グラニセトン・パロノセトン	1	A	遅発性嘔吐		
	イメンドカプセル125mg	アプレピタント		C	Day 2~3:	デカドロン錠4~8mg	
★投与スケジュール			1コース 21日	★点滴時間 2時間45分			
day	1.....8.....15..... 22(2コースday1)						
GEM	↓	↓	↓	投与ルート1	①→② 輸液 120分以上		
CDDP	↓	↓	↓	投与ルート2	③前投薬30分   ④ランダ 60分   ⑤ジェムザール30分   ⑥生食15分 →		