

レジメン名		GC療法(GEM+CDDP) (1コース:28日)		適応:尿路上皮がん		
RP	商品名	一般名	投与量	標準投与量	変更投与量	標準比
②	ジェムザール	ゲムシタピン(GEM)	1000 mg/m ²	mg	mg	%
⑦	ランダ	シスプラチン(CDDP)	70 mg/m ²	mg	mg	%
嘔吐対策(GEM) リスク(ASCO):			low risk(10~30%)	投与量	ガイドライン(推奨) : 急性嘔吐	
① GEM 前投薬	デカドロン 3.8mg/1mL	デキサメタゾンナトリウム	3	A	前投薬 :	ステロイド
	5HT3RA不要	グラニセトロン・パロノセトロン			遅発性嘔吐	
	イメドカプセル125mg	アプレピタント	0	C	Day 2~3:	なし
嘔吐対策(CDDP) リスク(ASCO):			high risk(>90%)	投与量	ガイドライン(推奨) : 急性嘔吐	
⑥ CDDP 前投薬	デカドロン 3.8mg/1mL	デキサメタゾンナトリウム	3	A	前投薬 :	5HT3RA +ステロイド+NK1RA
	アロキシ注 0.75mg	グラニセトロン・パロノセトロン	1	A	遅発性嘔吐	
	イメドカプセル125mg	アプレピタント	1	C	Day 2~3:	デカドロン錠+イメド [®] 80
☆投与スケジュール 1コース 28日			☆点滴時間			
day	1 2...8...15...22...28 29 30...					
GEM	↓ ↓ ↓ ↓	day1,8,15				
CDDP	↓ ↓	(1時間15分)				
	1コース 2コース	day2				
		(2時間30分)				