

投与計画書

レジメン名		GCa療法(GEM+CBDCA) (1コース:28日)		適応:尿路上皮がん ※適外		
RP	商品名	一般名	投与量	標準投与量	変更投与量	標準比
②	ジェムザール	ゲムシタピン(GEM)	1000 mg/m ²	mg	mg	100 %
⑤	パラプラチン	カルボプラチン(CBDCA)	5 AUC(4~6)	mg	mg	100 %
血清Cr:			mL/min →	CCr: mL/min(125上限)		
嘔吐対策(GEM) リスク(ASCO): low risk(10~30%)			投与量	ガイドライン(推奨): 急性嘔吐		
① GEM 前投薬	デカドロン 3.3mg/1mL	デキサメタゾンナトリウム	1 A	前投薬:	ステロイド*	
	5HT3RA不要	オンジセトン・グラニセトン・パロメトン		遅発性嘔吐		
	イメドカプセル125mg	アプレピタント	C	Day9 16:	なし	
嘔吐対策(GDDP) リスク(ASCO): moderate risk(30~90%)			投与量	ガイドライン(推奨): 急性嘔吐		
④ CBDCA 前投薬	デカドロン 3.3mg/1mL	デキサメタゾンナトリウム	1 A	前投薬:	5HT3RA +ステロイド*+NK1RA	
	アロキシ注 0.75mg	オンジセトン・グラニセトン・パロメトン	1 A	遅発性嘔吐		
	イメドカプセル125mg	アプレピタント	1 C	Day 2~3:	デカドロン錠+イメド*80	
Dr記載欄 (減量理由、治療方針等)			★点滴時間			
			day1,8,15	メイン	① 前投薬 30分	
			(1時間15分)	サブ	③ 生食15分	
★投与スケジュール 1コース 28日			②ジェムザール30分			
day	1 2...8...15...22...28	29 30				
GEM	↓ ↓ ↓ ↓	↓				
CBDCA	↓	↓				
			day2	メイン	④ 前投薬 30分	
			(1時間45分)	サブ	⑥ 生食15分	
			⑤パラプラチン 60分			
			2コース			